

》 乳幼児期に受ける定期予防接種

乳幼児期に受ける定期予防接種の予診票は、出生届の際にお渡ししています。

※標準的な接種期間とは、病気の性質などからこの期間に接種を受けることが最も望ましいと考えられる期間です。

| ワクチンの種類 | | 対象年齢 | 標準的な接種期間 ※ | 接種方法 | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|----|--|
| ロタウイルス | □タリックス (1価) | 出生 6 週 0 日後から 出生 24 週 0 日後まで | 初回接種については 生後 2 月に至った日から 出生 14 週 6 日後までの間 | □タリックス(1価) | 27 日以上の間隔をおいて 2 回 | | |
| | □タテック (5価) | 出生 6 週 0 日後から 出生 32 週 0 日後まで | | □タテック(5価) | 27 日以上の間隔をおいて 3 回 | | |
| 小児用肺炎球菌 | | 生後 2 か月から 5 歳の誕生日の 前日まで | 初回接種開始は、生後 2 か月から 生後 7 か月まで 1 歳までに 27 日以上の間隔をおいて 3 回 追加接種は、生後 12 か月から生後 15 か月まで 初回終了後 60 日以上の間隔をおく | 接種開始時期 | | | |
| | | | | 初 回 | | 追加 | |
| | | | | 生後 2 か月から 生後 6 か月の間 | 2 歳の誕生日の前日までの間に 27 日以上の間隔をおいて 3 回。ただし、2 回目、3 回目の接種は 2 歳を超えた場合は行わない（追加接種は右記の通り可能）。また、1 歳を超えて 2 回目の接種を行った場合は、3 回目の接種は行わない（追加接種は右記の通り可能）。 | | 初回接種終了後 60 日以上の間隔 をおいて、1 歳の 誕生日以降にお いて 1 回 |
| | | | | 生後 7 か月から 1 歳の誕生日の 前日まで | 2 歳の誕生日の前日までの間に 27 日以上の間隔をおいて 2 回。ただし、2 回目の接種は 2 歳の誕生日を超えた場合は行わない（追加接種は右記の通り可能）。 | | |
| 1 歳の誕生日から 2 歳の誕生日の前日まで 2 歳の誕生日から 5 歳の誕生日の前日まで | 60 日以上の間隔をおいて 2 回 1 回 | | | | | | |
| Hib 感染症 (ヒブ) | | 生後 2 か月から 5 歳の誕生日の前日まで | 初回接種開始は、生後 2 か月から 生後 7 か月まで 27 日から 56 日までの間隔をおいて 3 回 追加接種は、初回接種終了後 7 か月 から 13 か月までの間隔をおく | 接種開始時期 | | | |
| | | | | 初 回 | | 追加 | |
| | | | | 生後 2 か月から生後 6 か月の間 | 1 歳の誕生日の前日までの間に 27 日以上の間隔をおいて 3 回。ただし、2 回目、3 回目の接種は 1 歳を超えた場合は行わない（追加接種は 27 日以上の間隔をおいて 1 回可能）。 | | 初回接種終了後 7 か月以上の間隔 をおいて 1 回 |
| | | | | 生後 7 か月から 1 歳の誕生日の 前日まで | 1 歳の誕生日の前日までの間に 27 日以上の間隔をおいて 2 回。ただし、2 回目の接種は 1 歳を超えた場合は行わない（追加接種は 27 日以上の間隔をおいて 1 回可能）。 | | |
| 1 歳から 5 歳の誕生日の前日まで | 1 回 | | | | | | |
| B 型肝炎 | | 1 歳の誕生日の前日まで | 生後 2 か月から生後 9 か月まで | 27 日以上の間隔をおいて 2 回接種した後、1 回目の接種から 139 日以上の間隔をおいて 1 回 | | | |
| 四種混合 (ジフテリア・百日ぜき・ 破傷風・ポリオ) | | 生後 3 か月から 7 歳 5 か月まで | 1 期初回は、生後 3 か月から 1 歳まで 20 日から 56 日までの間隔をおいて 3 回 1 期追加は、1 期初回接種 (3 回) 終了後 12 か月から 18 か月までの間隔をおく | 1 期初回：20 日以上の間隔をおいて 3 回 1 期追加：1 期初回の 3 回目接種後、6 か月以上の間隔をおいて 1 回 | | | |
| BCG | | 1 歳の誕生日の前日まで | 生後 5 か月から生後 8 か月まで | 1 回 | | | |
| 麻しん 風しん (MR) | 1 期 | 1 歳から 2 歳の誕生日の前日まで | | 1 回 | | | |
| | 2 期 | 小学校入学の前年度の 4/1 ~ 3/31 (幼稚園・保育所の年長相当) | | 1 回 (H27.4.2 ~ H28.4.1 までに生まれた人は、R3.4.1 ~ R4.3.31 までに受けてください) | | | |
| 水痘 (みずぼうそう) | | 1 歳から 3 歳の誕生日の 前日まで | 1 回目の接種は、1 歳から生後 15 か月まで 2 回目の接種は、1 回目の接種終了後 6 か月から 12 か月までの間隔をおく | 3 か月以上の間隔をおいて 2 回 | | | |
| 日本脳炎 | 1 期初回 | 生後 6 か月から 7 歳 5 か月まで | 3 歳から 4 歳まで 6 日から 28 日までの間隔をおいて 2 回 | 1 期初回：6 日以上の間隔をおいて 2 回 | | | |
| | 1 期追加 | | 4 歳から 5 歳まで 上記終了後、おおむね 1 年の間隔をおく | 1 期追加：上記終了後、6 か月以上の間隔をおいて 1 回 | | | |